



Start Well Childhood Vaccines

IMMUNIZATION TIMING 2026

Kids need vaccines to protect them from serious diseases.

Within the first year, some babies may need one dose of RSV. Talk to your doctor to see what's right for your baby.

COVID-19 vaccination is recommended for ages 6 months and older.

To best protect your child, get them a flu vaccine every fall. Everyone 6 months and older should get the flu vaccine. To best protect your child, get them the flu vaccine during the fall season.



At Birth

HepB
(Hepatitis B)

Age 2 months

DTaP
(Diphtheria, Tetanus, Pertussis)

IPV
(Polio)

HepB
(Hepatitis B)

Hib
(Hib meningitis)

PCV
(Pneumo)

RV
(Rotavirus)

Age 4 months

DTaP
(Diphtheria, Tetanus, Pertussis)

IPV
(Polio)

Hib
(Hib meningitis)

PCV
(Pneumo)

RV
(Rotavirus)

Age 6 months

DTaP
(Diphtheria, Tetanus, Pertussis)

IPV
(Polio)

HepB
(Hepatitis B)

Hib
(Hib meningitis)

PCV
(Pneumo)

RV
(Rotavirus)

Flu
2 shots one month apart

Age 12 months

HepA
(Hepatitis A)

MMR
(Measles, Mumps and Rubella)

Hib
(Hib meningitis)

PCV
(Pneumo)

Varicella
(Chicken Pox)

Age 15 months

DTaP
(Diphtheria, Tetanus, Pertussis)

Age 18 months

HepA
(Hepatitis A)

Age 4-6 YEARS

DTaP
Polio
MMR
Varicella

Age 11-12 YEARS

Tdap
HPV
(2 doses)
Meningitis

Age 16-18 YEARS

Meningitis
Meningitis B
(2 doses)

Please ask your doctor how far apart to have the vaccines. For more information, visit: [AAP.org/ImmunizationSchedule](https://www.aap.org/ImmunizationSchedule)



Inicie Saludable Vacunas infantiles

EDADES DE VACUNACIÓN 2026

Los niños necesitan vacunas para protegerlos de enfermedades graves.

Durante el primer año, algunos bebés pueden necesitar una dosis contra el virus sincitial respiratorio (*Respiratory Syncytial Virus, RSV*). Hable con su médico para saber qué es lo mejor para su bebé.

La vacuna contra el COVID-19 se recomienda a partir de los seis meses de edad.

Mantenga a su hijo a salvo de la gripe en el otoño. Todas las personas a partir de los seis meses de edad deben vacunarse contra la gripe. Para proteger mejor a su hijo, vacúnelo contra la gripe durante la temporada de otoño.



Al nacer

HepB
(hepatitis B)

Edad 2 meses

DTaP
(difteria, tétanos y tos ferina)

IPV
(Polio)

HepB
(hepatitis B)

Hib
(meningitis por Hib)

PCV
(neumonía)

RV
(rotavirus)

Edad 4 meses

DTaP
(difteria, tétanos y tos ferina)

IPV
(Polio)

Hib
(meningitis por Hib)

PCV
(neumonía)

RV
(rotavirus)

Edad 6 meses

DTaP
(difteria, tétanos y tos ferina)

IPV
(Polio)

HepB
(hepatitis B)

Hib
(meningitis por Hib)

PCV
(neumonía)

RV
(rotavirus)

Gripe
2 dosis/
intervalo de un mes

Edad 12 meses

HepA
(hepatitis A)

MMR
(sarampión, paperas y rubéola)

Hib
(meningitis por Hib)

PCV
(neumonía)

Varicela
(peste cristal)

Edad 15 meses

DTaP
(difteria, tétanos y tos ferina)

Edad 18 meses

HepA
(hepatitis A)

Edad 4 a 6 AÑOS

DTaP
Polio
MMR
Varicela

Edad 11 a 12 AÑOS

Tdap
HPV
(2 dosis)
Meningitis

Edad 16 a 18 AÑOS

Meningitis
Meningitis B
(2 dosis)

Pregunte a su médico cuánto tiempo debe pasar entre una vacuna y otra. Para obtener más información, visite: AAP.org/ImmunizationSchedule

赢在健康起跑点

儿童疫苗

2026年免疫接种时间表

IEHP
Inland Empire Health Plan

儿童需要接种疫苗，以保护他们免于罹患严重疾病。

出生时
HepB
(B型肝炎)

2个月大

DTaP
(白喉、破伤风、百日咳)

小儿麻痹
(Inactivated Polio Vaccine, IPV)

HepB
(B型肝炎)

Hib
(b型流感嗜血杆菌脑膜炎)

PCV
(肺炎链球菌)

RV
(轮状病毒)

4个月大

DTaP
(白喉、破伤风、百日咳)

小儿麻痹
(Inactivated Polio Vaccine, IPV)

Hib
(b型流感嗜血杆菌脑膜炎)

PCV
(肺炎链球菌)

RV
(轮状病毒)

6个月大

DTaP
(白喉、破伤风、百日咳)

小儿麻痹
(Inactivated Polio Vaccine, IPV)

HepB
(B型肝炎)

Hib
(b型流感嗜血杆菌脑膜炎)

PCV
(肺炎链球菌)

RV
(轮状病毒)

流感
两剂疫苗
间隔一个月

12个月大

HepA
(A型肝炎)

MMR
(麻疹、腮腺炎及德国麻疹)

Hib
(b型流感嗜血杆菌脑膜炎)

PCV
(肺炎链球菌)

水痘

有些宝宝可能需要在第一年内接种一剂呼吸道融合病毒疫苗 (Respiratory Syncytial Virus, RSV)。请咨询您的医生以确认哪些疫苗适合您的宝宝。



建议6个月以上的儿童接种COVID-19疫苗。

为了给孩子提供最好的保护，请在每年秋季为他们接种流感疫苗。所有6个月及以上的人都应该接种流感疫苗。为了更好地保护您的孩子，请让他们在秋季接种流感疫苗。

4-6岁
DTaP
小儿麻痹
MMR
水痘


11-12岁
Tdap
人类乳突病毒
(Human Papillomavirus, HPV) (2剂)
脑膜炎

16-18岁
脑膜炎
B型流行性脑膜炎
(2剂)

15个月大
DTaP
(白喉、破伤风、百日咳)

18个月大
HepA
(A型肝炎)

请向您的医生咨询各疫苗的接种间隔时间。如需更多资讯，请前往：
AAP.org/ImmunizationSchedule



Khởi Đầu Tốt Đẹp

Vắc-Xin Cho Trẻ Em THỜI ĐIỂM CHỪNG NGỪA NĂM 2026




Trẻ em cần tiêm vắc-xin để được bảo vệ khỏi các bệnh nghiêm trọng.

Trong năm đầu tiên, một số trẻ sơ sinh có thể cần một liều ngừa vi-rút hợp bào hô hấp (respiratory syncytial virus, RSV). Hãy trao đổi với bác sĩ để xem loại nào phù hợp với con quý vị.

Nên tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

Giữ con quý vị an toàn khỏi bệnh cúm.

Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vắc-xin cúm. Để bảo vệ con quý vị một cách tốt nhất, hãy tiêm vắc-xin cúm cho trẻ vào mùa thu.



4-6 TUỔI

DTaP
Bại liệt
MMR
Thủy đậu

11-12 TUỔI

Tdap
HPV (2 liều)
Meningitis

16-18 TUỔI

Meningitis
Meningitis B (2 liều)

Vui lòng hỏi bác sĩ của quý vị về khoảng thời gian cách nhau giữa các loại vắc-xin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

AAP.org/ImmunizationSchedule